

〈脱水に注意が必要な方へ〉



モビプレップ® 配合内用剤 服用のしかた

便がほぼ透明になるまで、モビプレップ® をゆっくりと時間をかけてお飲みください。《目安はコップ1杯(約180mL)あたり、10～15分》

水(お茶)は必ず1杯以上飲みましょう!!

モビプレップ® の服用の途中でも水分は飲んでかまいません

のどが渴いたらいつでも追加の水分をとる!

服用中に「おかしいな」と思ったらすぐに連絡!




最後に、水(お茶)を飲むのを忘れずに!

モビプレップ®

水またはお茶


ステップ

1




ステップ

2



ステップ


3



まだ便が透明にならない場合は ↓ 次のステップに進んでください。


ステップ

4




ステップ

5



ステップ

6



次の症状があらわれた場合には、がまんせずに直ちに服用を中止し、医師、看護師、薬剤師等に連絡してください。服用後に症状があらわれた場合にも、同様にご連絡ください。

気分がわるい / 吐き気がする / 吐いた / お腹が痛い / 顔が青ざめる / 息苦しい / 寒気がする / 顔がむくむ / めまいがする / じんましんがでる など

※「モビプレップ」及び「MOVIPREP」は、Norgineグループの登録商標です。